

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92.06.25 et 92.26.94)

ABONNEMENT ANNUEL
15 F

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES,
BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde)
C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

Supplément N° 1 au Bulletin Technique N° 67 d'Avril 1966

1966-II

AVERTISSEMENTS

ARBRES FRUITIERS

Tavelures des Poiriers et des Pommiers - Le relèvement de la température a provoqué une reprise de la végétation et la formation de jeunes feuilles sur les variétés précoces ainsi que l'apparition de boutons floraux sur les variétés tardives.

Les projections d'Ascospores risquent encore d'être très nombreuses au cours des prochaines pluies et comme nous le pensions les premières taches primaires ont été découvertes sur les fleurs les 26 et 27 mars.

Pour éviter de nouvelles contaminations il serait utile d'appliquer un nouveau traitement dès à présent sur l'ensemble des poiriers et des pommiers.

Hoplocampe des Prunes - Les pontes observées sont de faible importance et il est à prévoir que les dégâts seront limités.

En conséquence, un traitement n'est conseillé que dans les vergers habituellement attaqués les années précédentes.

Ce traitement devra être effectué entre le 6 et le 10 avril avec un produit à base d'H.C.H. (100 grs de matière active / Hl.) ou de Parathion (25 grs de matière active/Hl.) ou mieux d'Oléoparathion à la dose de 0,8% en particulier dans les vergers où la présence d'oeufs d'hiver d'araignée rouge (*Panonychus ulmi*) a été observée.

Dans les plantations dont la floraison présente un certain retard, il y a lieu d'attendre la chute complète des pétales (Protection des Abeilles).

Notons en outre, que ce traitement est également efficace contre les Chenilles défoliatrices.

INFORMATIONS

Pucerons - Les premières colonies sont signalées dans plusieurs vergers de la Circonscription. Nous rappelons que les traitements doivent être appliqués dès l'apparition des insectes.

AVERTISSEMENTS

VIGNE

Black-Rot - L'évolution du Black-Rot est une nouvelle fois très précoce. Des projections d'Ascospores ont même été observées depuis plusieurs jours. Par contre, la vigne présente un débourrement très irrégulier.

Les premières contaminations peuvent néanmoins se produire au cours des prochaines pluies dans les parcelles les plus avancées.

Il reste bien entendu que seules les vignes présentant des bourgeons évolués, atteintes l'an dernier ou se trouvant à proximité de parcelles incultes doivent être traitées.

Bordeaux, le 4 avril 1966

Le Contrôleur chargé des Avertissements
C. ROUSSEL

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux
J. BRUNETEAU

L'imprimerie de la Station de Bordeaux
Directeur Gérant: L. BOUYX

P 198